

货号	名称	规格	存储
F1511-12T	RNA Pull-Down 试剂盒 (植物)	12T	-20℃
F1511-24T	RNA Pull-Down 试剂盒 (植物)	24T	-20℃
F1511-40T	RNA Pull-Down 试剂盒 (植物)	40T	-20℃

产品简介

RNA Pull-Down 试剂盒利用一段只有 16nt 的 RNA 标签“F2”标记 RNA，之后采用特异性配体磁珠，高效调取样本中的目标 F2-RNA 及其结合蛋白或结合 RNA。F2 标签是短 RNA 序列，与目标 RNA 连接后，几乎不影响其结构和功能，可以用于标记各种类型的 RNA。

试剂盒成分

编号	名称	12T 规格	24T 规格	40T 规格	储存条件
①	磁珠	500 μ L	1 mL	1.7 mL	4℃, 1 年
②	裂解缓冲液	7mL	14mL	22 mL	4℃, 1 年
③	NT2 缓冲液	32mL	64 mL	105mL	4℃, 1 年
④	RNA 结构缓冲液	650 μ L	1.3mL	2.2mL	4℃, 1 年
⑤	漂洗液	32mL	64 mL	105mL	4℃, 1 年
⑥	洗脱缓冲液	650 μ L	1.3mL	2.2mL	-20℃, 1 年
⑦	蛋白酶抑制剂	230 μ L	460 μ L	760 μ L	-20℃, 1 年
⑧	RNase 抑制剂	65 μ L	130 μ L	220 μ L	-20℃, 1 年
⑨	F2 配体	250 μ L	500 μ L	840 μ L	-20℃, 1 年
⑩	10mL 离心管	1 个	1 个	1 个	——

***注意：**该试剂盒包含足够完成 12、24 或 40 个反应的试剂，每个反应使用 40 μ L 磁珠。由于每次 pull-down 实验至少需要设置一个实验组和一个阴性对照组，因此一次实验至少需要使用 2 个反应的试剂量。

额外所需材料

1. 自备材料：PBS、RNase-free 水、制备 RNA 探针所需的材料【T7 体外转录试剂盒、DNA 凝胶回收试剂盒】、微量 RNA 提取试剂盒或提取 RNA 所需的材料【Trizol、氯仿、异丙醇、75%乙醇】。
2. 所需仪器：磁力架、混匀仪、低温离心机、超声波破碎仪。

使用说明

I 注意事项

1. 请勿干燥或剧烈涡旋磁珠，禁止长时间置于磁场，这些操作可能会引起磁珠聚团，降低结合活性。
2. 为保证磁珠均匀分布，请在使用前通过反复颠倒、轻微涡旋彻底混匀磁珠。
3. **请务必使用无 RNase 的离心管、枪头等实验材料。**
4. 具体样品量和孵育时间依赖于每个特定体系，可能需要优化才能得到最大产量。
5. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

II 实验前准备工作

RNA 探针制备

(1) 根据目标 RNA 序列设计带有 T7 启动子 (TAATACGACTCACTATAGGG) 和 F2 标签序列 (GGCGCTGACAAAGCGCC) 的引物，以目标序列的 DNA 质粒为模板，PCR 分别获得 T7-正义 RNA-F2 (实验组) 和 T7-反义 RNA-F2 (对照组) 转录模板，按照 DNA 凝胶回收试剂盒说明书回收目标 DNA；

引物名称	引物序列
正义链-正引物 (带 T7 启动子)	5' - TAATACGACTCACTATAGGG+目标 RNA 头部序列 -3'
正义链-反引物 (带 F2 标签)	5' - GGCCTTTGTCAGCGCC+目标 RNA 尾部序列的反向互作序列 -3'
反义链-正引物 (带 F2 标签)	5' - GGCCTTTGTCAGCGCC+目标 RNA 头部序列 -3'
反义链-反引物 (带 T7 启动子)	5' - TAATACGACTCACTATAGGG+目标 RNA 尾部序列的反向互作序列 -3'

(2) 以上述 DNA 为模板, 按照自备的 RNA 体外转录试剂盒说明书配置反应体系, 以下为示例 (该体系和步骤可能因转录试剂盒的不同而有所差别, 请务必根据试剂盒说明书操作):

组分	用量
DNA 模板	0.5 μ g
10*Reaction Buffer	2 μ L
ATP/ GTP/ UTP/ CTP	各 2 μ L
T7 RNA Polymerase Enzyme Mix	2 μ L
RNase-free H2O	Up to 20 μ L

37°C 孵育 2h, 再加入 1 μ L DNase I, 37°C 孵育 15 min 将 DNA 模板消化, 得到正义和反义 RNA;

(3) 取 2 μ L RNA 检测浓度, 取 1~2 μ L RNA 进行 2% 琼脂糖凝胶电泳检测 RNA 质量和长度; 符合要求的 RNA 置于 -80°C 保存或直接用于后续实验。

*** 注意:**

- i. 由于 RNA 容易降解, 最好在 RNA pull-down 实验当天或前一天进行体外转录实验。
- ii. 当目标序列过短 (<300bp) 或过长 (>4kb) 时, 探针制备难度将增加; 长序列可以分段进行实验。

III 操作方法

1. 样本裂解

- (1) 实验组和对照组一共取 0.4~0.6 g 植物组织, 用 RNase-free 水清洗干净, 置于研钵中, 用液氮充分研磨, 再转移粉末至预冷的、新的无 RNase 离心管中;
- (2) 将样本置于冰上, 每组加入 1mL 预冷的②裂解缓冲液、10 μ L ⑦蛋白酶抑制剂 (按 1%添加) 和 5 μ L ⑧RNA 酶抑制剂 (按 0.5%添加), 吹打混匀;
- (3) 冰上超声破碎至溶液基本澄清;
- (4) 4°C 12000 g 离心 15 min, 收集上清至新的无 RNase 离心管中; 取 30 μ L 作为 input, 剩余上清平分为两份用于 pull-down 实验, 记为实验组和对照组, 置于冰上备用或 -80°C 保存。

*** 注意:** i. 当样本不能完全裂解时 (溶液很浑浊), 可以增加裂解缓冲液或改善超声条件继续裂解。超声条件因样本类型和超声设备而异, 应提前摸索好合适的条件。

ii. 如果样本中目标蛋白或 RNA 丰度较低, 或结合物间的结合较弱, 可以增加初始样本量, 同时等比例增加裂解缓冲液和酶抑制剂的用量, 但总孵育体积最大不超过离心管体积的 2/3, 体积过大可以更换大规格离心管。

2. 磁珠准备

- (1) 将①磁珠上下颠倒混匀, 取实验组和对照组一共所需的 80 μ L 磁珠到新的无 RNase 离心管中;
- (2) 加入 1 mL ③NT2 缓冲液, 颠倒混匀 30 次, 放磁力架上静置 1 min 并弃上清;
- (3) 重复上步操作一次;
- (4) 加入 400 μ L ③NT2 缓冲液, 上下颠倒重悬磁珠;
- (5) 加入 40 μ L ⑨F2 配体, 混匀仪上室温孵育 30 min;
- (6) 放磁力架上静置 1 min 并弃上清;
- (7) 加入 1 mL ③NT2 缓冲液, 颠倒混匀 30 次, 放磁力架上静置 1 min 并弃上清;
- (8) 重复上步操作一次;

(9) 加入 600 μ L ③NT2 缓冲液，上下颠倒重悬磁珠，将磁珠平分为两份，每组各约 300 μ L，转移到新的无 RNase 离心管中，记为实验组和对照组。

3. 漂洗液准备

为了防止实验过程中的蛋白和 RNA 降解，需要向漂洗液中添加蛋白酶抑制剂和 RNase 抑制剂。取出⑨10 mL 离心管，加入实验组和对照组总共所需的 5 mL ⑤漂洗液、25 μ L ⑦蛋白酶抑制剂（按 0.5%添加）和 2.5 μ L ⑧ RNase 抑制剂（按 0.05%添加），混合均匀，冰上保存，现配现用。如果有多组样本，请按照实际使用量配置。

4. RNA pull-down

- (1) 取 3 μ g RNA 探针，95 $^{\circ}$ C 变性 3 min，冰浴 1 min，短暂离心甩下管壁液体，向管中加入 50 μ L ④RNA 结构缓冲液和 1 μ L ⑧RNase 抑制剂，室温放置 30 min；
- (2) 将实验组和对照组 RNA 探针分别加入对应的磁珠（步骤 2 制备）中，混匀仪上室温孵育 30 min；
- (3) 放磁力架上静置 1 min 并弃上清；
- (4) 每组加入 500 μ L 漂洗液（步骤 3 准备），颠倒混匀 30 次，放磁力架上静置 1 min 并弃上清；
- (5) 重复上步操作一次；
- (6) 加入相应组别的样本裂解液（步骤 1 制备），混匀仪上 4 $^{\circ}$ C 孵育 2~4 h；
- (7) 放磁力架上静置 1 min 并弃上清；
- (8) 每组加入 500 μ L 漂洗液（步骤 3 准备），颠倒混匀 30 次，放磁力架上静置 1 min 并弃上清；
- (9) 重复上步漂洗操作两次，共漂洗三次，保留磁珠。

5. 蛋白洗脱（选做）

如果需要对 pull down 产物进行蛋白检测，可以在以下方案中选择合适的洗脱方法。

- (1) 非变性洗脱法：向磁珠中加入 50 μ L ⑥洗脱缓冲液，涡旋震荡 20 s，混匀仪上室温洗脱 10~15 min；涡旋震荡 20s，1000g 离心 20s；放磁力架上静置 1 min，收集上清至新的离心管中，- 80 $^{\circ}$ C 保存。该洗脱产物保持原有的生物活性，适用于后期各种检测，例如质谱、SDS-PAGE 或 Western-blot 等。
- (2) SDS-PAGE 上样缓冲液洗脱法（变性洗脱法）：向磁珠中加入 50 μ L 1 \times SDS-PAGE 上样缓冲液，95 $^{\circ}$ C 加热 5 min；磁力架上静置 1 min，收集上清至新的离心管中。该洗脱产物适用于 SDS-PAGE 或 Western Blot 检测；如果需要进行质谱检测，则切胶条后送检。

* **注意：** i. 本试剂盒提供的洗脱缓冲液可以兼容质谱。

ii. 如果选择非变性洗脱法，可以暂时保留洗脱后的磁珠，当非变性洗脱效率较低时，则采用 SDS-PAGE 上样缓冲液洗脱法继续洗脱蛋白。

iii. RNA pull-down 捕获的蛋白量通常较少，因此 SDS-PAGE 建议用硝酸银染色，染色步骤参考如下：

（为了便于称量，每步配置的溶液体积较大，实际操作时取适量溶液浸泡胶即可）

- (1) 固定：30 min（乙醇：乙酸：水=4：1：5 体积比）；
- (2) 敏化：30 min（乙酸钠 10.2 g，硫代硫酸钠 0.471 g，乙醇 45 mL，加水至 150 mL）；
- (3) 水洗：4 次，每次 10 min；
- (4) 银染：30 min（硝酸银 0.375 g，加水至 150 mL）；
- (5) 水洗：2 次，每次 40 s；
- (6) 显色：显影至条带清楚（碳酸钠 3.75 g，60 μ L 甲醛，加水至 150 mL）；
- (7) 终止：5 min（Na₂ EDTA 2.19 g，加水至 150 mL）。

6. RNA 提取纯化（选做）

如果需要对 pull down 产物进行 RNA 检测，请购买微量 RNA 提取试剂盒或按照以下步骤提取 RNA。

- (1) 向磁珠中加入 1 mL Trizol，室温静置 5 min，4 $^{\circ}$ C 12000 g 离心 10 min，取上清；
- (2) 加入 0.2 mL 氯仿，涡旋混匀或剧烈晃动 15 s，室温放置 2~3 min；
- (3) 4 $^{\circ}$ C 12000g 离心 15 min，吸取水相至新的无 RNase 离心管中（约可吸取 0.5-0.55 mL）；
- (4) 加入 0.5 mL 异丙醇，颠倒数次混匀，室温下沉淀 10 min 或 -20 $^{\circ}$ C 沉淀过夜；
- (5) 4 $^{\circ}$ C 12000g 离心 10 min，管底可见 RNA 沉淀，弃上清；

- (6) 加入 1 mL 75%乙醇 (DEPC 水或 RNase-free 水配制) ;
 (7) 4°C 12000g 离心 10 min, 弃上清; 5000g 快速离心 1s, 小心吸尽液体;
 (8) 待 RNA 略干后, 加入 20 μL DEPC 水或 RNase-free 水或溶解, -80°C 保存或直接进行反转录。

*** 注意:** i. Pull down 后的 RNA 一般较微量, 操作时注意勿把 RNA 沉淀吸走;
 ii. 切勿让 RNA 过分干燥, 否则将极难溶解, 且测出的 A260/280 值会低于 1.6。


问题解决

问题	可能原因	解决方案
获得的复合产物少	样本量不够	提高样本用量
	孵育时间不够	延长孵育时间 (如孵育过夜), 但需要注意孵育时间过长也可能导致非特异性结合增多
	RNA 探针量不够	提高 RNA 探针用量
SDS-PAGE 检测有很多非特异结合的条带	非特异性的蛋白结合在磁珠上	增加漂洗时间和次数, 或样本预处理: 先与磁珠孵育, 去除非特异结合蛋白


使用案例

实验目标: 检测目标 RNA 与待测蛋白 (Prey) 是否存在相互作用。

- (1) Input: 样本裂解液;
 (2) F2-antisense: F2-RNA 反义链探针的 pull-down 产物 (对照组);
 (3) F2-sense: F2-RNA 正义链探针的 pull-down 产物 (实验组)。



待测蛋白的 F2-RNA pull-down WB 检测图



F2-RNA pull-down 蛋白银染图